がん化学療法レジメン集

埼玉県済生会川口総合病院

《外科》

レジメン	乳がん EC 療法			番号	SBR-01
適 応	術後補助化学療法　転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エピルビシン	75～100mg/㎡	第 1 日	div	3～4 週 1 コース 術後補助の場合 4 コース	
エンドキサン	500～600mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん PC 療法			番号	SBR-03
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ピノルビン	40mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	
エンドキサン	500mg/body	第 1 日	div		

レジメン	乳がん weekly PTX 療法			番号	SBR-04
適 応	転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1 日	div	毎週繰り返し	

レジメン	乳がん DOC 療法			番号	SBR-06
適 応	転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div	3～4 週 1 コース	

レジメン	乳がん VNR 療法			番号	SBR-07
適 応	進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ロゼウス	25mg/㎡	第 1,8 日	div(5 分)	3 週 1 コース	

レジメン	乳がん FEC 療法			番号	SBR-12
適 応	術後補助化学療法、転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エピルビシン	100mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コース繰り返す	
エンドキサン	500mg/㎡	第 1 日	div		
5-FU	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん tri-weekly HER 療法			番号	SBR-16
適 応	(HER2 過剰発現) 乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg (2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	乳がん GEM 療法			番号	SBR-17
適 応	切除不能・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1250mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース 繰り返し	

レジメン	乳がん nabPTX 療法（tri-weekly）			番号	SBR-19
適 応	進行・転移・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アブラキサン	260mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 繰り返し	

レジメン	乳がん CPT-11 療法			番号	SBR-21
適 応	進行・再発・手術不能乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース 繰り返し	

レジメン	乳がん nabPTX+tri-weekly HER 療法			番号	SBR-22
適 応	手術不能・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div	3 週 1 コース	
アブラキサン	260mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん tri-weekly PTX+ tri-weekly HER 療法			番号	SBR-23
適 応	進行・転移・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	210mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	乳がん DOC+tri-weekly HER 療法			番号	SBR-24
適 応	進行・転移・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	乳がん GEM+tri-weekly HER 療法			番号	SBR-25
適 応	進行・再発・切除不能乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1250mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	乳がん ERI 療法			番号	SBR-26
適 応	切除不能・進行再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ハラヴェン	1.4mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース 減量時の投与量 1.4mg/ ㎡ → 1.1mg/ ㎡ → 0.7mg/㎡→中止	

レジメン	乳がん ERI　bi-weekly 療法			番号	SBR-27
適 応	切除不能・進行再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ハラヴェン	1.4mg/㎡	第 1 日	div	2 週 1 コース 減量時の投与量 1.4mg/ ㎡ → 1.1mg/ ㎡ → 0.7mg/㎡→中止	

レジメン	乳がん Bev＋weekly PTX 療法			番号	SBR-28
適 応	切除不能・進行再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	90mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	
ベバシズマブ	10mg/kg	第 1,15 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		

レジメン	乳がん TC 療法			番号	SBR-29
適 応	乳がん術後補助化学療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コース施行	
エンドキサン	600mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん VNR+tri-weekly HER 療法			番号	SBR-30
適 応	進行・再発・切除不能乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ロゼウス	25mg/㎡	第 1,8 日	div （側管から全開）	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	乳がん CMF 療法			番号	SBR-31
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エンドキサン	100mg/㎡	第 1～14 日	p.o.	4 週 1 コース	
メソトレキセート	40mg/㎡	第 1,8 日	div		
5-FU	600mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	乳がん PER+HER+DOC 療法			番号	SBR-32
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん tri-weeklyHER+ERI 療法			番号	SBR-33
適 応	切除不能・進行再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ハラヴェン	1.4mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース ハラヴェン 減量時の投与量 1.4mg/ ㎡ → 1.1mg/ ㎡ → 0.7mg/㎡→中止	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		
レジメン	乳がん PER+HER+nabPTX 療法			番号	SBR-35
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		
アブラキサン	260mg/㎡	第 1 日	div		
レジメン	乳がん カドサイラ療法			番号	SBR-36
適 応	HER2 陽性　進行再発・切除不能乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カドサイラ	3.6mg/ kg	第 1 日	div	3 週 1 コース 減量時の投与量 3.6mg/ kg→3.0mg/ kg→ 2.4mg/ kg→中止	

レジメン	乳がん PER+HER 療法			番号	SBR-37
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	乳がん Atezo+nabPTX 療法			番号	SBR-38
適 応	PD-L1 陽性トリプルネガティブ乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	840mg/body	第 1,15 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	4 週 1 コース	
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	乳がん dose-dense EC 療法			番号	SBR-39
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エピルビシン	90mg/㎡	第 1 日	div	14 日 1 コース 4 コースまで PEG-G-CSF 製剤を点滴終了後、24 時間後以降投与	
エンドキサン	600mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん dose-dense PTX 療法			番号	SBR-40
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	14 日 1 コース 4 コースまで PEG-G-CSF 製剤を点滴終了後、24 時間後以降投与	

レジメン	乳がん PER+HER+S-1 療法			番号	SBR-41
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		
S-1	80mg/㎡/日（分 2）	第 1～14 日	40mg/回 1 日 2 回 p.o.		

レジメン	乳がん PER+HER+Cape 療法			番号	SBR-42
適 応	乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		
カペシタビン	2500mg/㎡/日（分 2）	第 1～14 日	1250mg/回 1 日 2 回 p.o.		

レジメン	乳がん エンハーツ療法			番号	SBR-43
適 応	HER2 陽性　進行再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
エンハーツ	5.4mg/ kg	第 1 日	div	3 週 1 コース 減量時の投与量 5.4mg/ kg→4.4mg/ kg→ 3.2mg/ kg→中止	

レジメン	乳がん Pembro+CBDCA+PTX 療法			番号	SBR-44
適 応	トリプルネガティブ乳がん　術前療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで CCr125mL/分まで	
カルボプラチン	AUC6 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	乳がん Pembro+EC 療法			番号	SBR-45
適 応	トリプルネガティブ乳がん　術前療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	
エピルビシン	90mg/㎡	第 1 日	div		
エンドキサン	600mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん Pembro 療法（3 週間ごと）			番号	SBR-46
適 応	トリプルネガティブ乳がん　術後療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	Div	3 週 1 コース 9 コースまで	

レジメン	乳がん Pembro+CBDCA+GEM 療法			番号	SBR-47
適 応	トリプルネガティブ進行再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース CCr125mL/分まで	
カルボプラチン	AUC2 2×(Ccr+25)mg	第 1,8 日	div		
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	(初回)フェスゴ療法			番号	SBR-48
適 応	HER2 陽性の乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
フェスゴ IN	1 瓶/body	第 1 日	s.c	3 週 1 コース 観察時間：フェスゴ投与後 30 分間	

レジメン	(2 回目以降)フェスゴ療法			番号	SBR-49
適 応	HER2 陽性の乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
フェスゴ MA	1 瓶/body	第 1 日	s.c	3 週 1 コース 観察時間：フェスゴ投与後 15 分間	

レジメン	(初回)フェスゴ+DOC 療法			番号	SBR-50
適 応	HER2 陽性の乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
フェスゴ IN	1 瓶/body	第 1 日	s.c	3 週 1 コース 観察時間：フェスゴ投与後 30 分間	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	(2 回目以降)フェスゴ+DOC 療法			番号	SBR-51
適 応	HER2 陽性の乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
フェスゴ MA	1 瓶/body	第 1 日	s.c	3 週 1 コース 観察時間：フェスゴ投与後 15 分間	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	食道がん DOC 療法			番号	SES-01
適 応	転移・進行・再発食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ドセタキセル	70mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	食道がん CDDP+5FU 療法			番号	SES-02
適 応	転移・進行・再発食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div		

レジメン	食道がん CDDP+5FU 低用量療法			番号	SES-03
適 応	転移・進行・再発食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	10mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
5-FU	500mg/㎡	第 1～5 日	div		

レジメン	食道がん放射線併用 CDDP+5FU 低用量 (FP)療法			番号	SES-08
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	5mg/body	第 1～5 日	div	放射線照射中継続	
5-FU	250mg/body	第 1～5 日	div		

レジメン	食道がん 5FU+CDDP+DOC 療法			番号	SES-09
適 応	食道がん（切除不能・再発・転移）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	60mg/㎡	第 1 日	div（1 時間）	4 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div（1 時間）		
5-FU	500mg/㎡	第 1～4 日	div（24 時間持続）		

レジメン	食道がん 5FU+nedaplatin+DOC 療法			番号	SES-10
適 応	食道がん（切除不能・再発・転移）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	60mg/㎡	第 1 日	div（1 時間）	4 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div（1 時間）		
5-FU	500mg/㎡	第 1～4 日	div（24 時間持続）		

レジメン	食道がん 放射線併用低用量 DOC 療法			番号	SES-11
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	10mg/㎡	第 1,8,15 22,29,36 日	div	6 週 1 コース	

レジメン	食道がん FOLFOX 療法			番号	SES-12
適 応	切除不能進行再発食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	食道がん放射線併用 FOLFOX 療法			番号	SES-13
適 応	切除不能進行再発食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	1600mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	食道がん Nivo 療法			番号	SES-14
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	食道がん Pembro+CDDP+5FU 療法			番号	SES-15
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div		
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div		

レジメン	食道がん Nivo+5FU+CDDP 療法			番号	SES-16
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div		
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div		

レジメン	食道がん Nivo+Ipi 療法			番号	SES-17
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	360mg/body	第 1,22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	食道がん DAC-TAM 療法			番号	SES-18
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ダカルバジン	220mg/body	第 1～3 日	div	4 週 1 コース	
ニドラン	60mg/㎡	第 1 日	div		
シスプラチン	25mg/㎡	第 1～3 日	div		
タモキシフェン	20 mg/日	第 1～28 日	p.o.		

レジメン	胃がん MTX+5FU 交代療法			番号	◎SST-01
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
メソトレキセート	30～100mg/㎡	第 1 日	div	1～2 週 1 コース	
5-FU	600mg/㎡	第 1 日	div		
ロイコボリン	10mg/㎡/回	メソトレキセート投与 24 時間後より 6 時間ごとに計 6 回			

レジメン	胃がん CPT-11+CDDP 療法			番号	SST-03
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	70mg/㎡	第 1,15 日	div	4 週 1 コース	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	胃がん CPT-11 療法			番号	SST-04
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	胃がん weekly PTX 療法			番号	◎SST-05
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	胃がん DOC 療法			番号	SST-07
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	胃がん S-1+CDDP 療法			番号	SST-08
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～21 日	40～60mg/回 1 日 2 回　p.o	5 週 1 コース 第 8,9 日は充分量の補液を要す	
シスプラチン	60mg/㎡	第 8 日	div		

レジメン	胃がん S-1＋CPT-11 療法			番号	◎SST-09
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80mg/㎡(分 2)	第 1～21 日	p.o.	5 週 1 コース	
トポテシン	80mg/㎡	第 1,15 日	div(2 時間)		

レジメン	胃がん S-1+DOC 療法			番号	SST-10
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	40～60mg/回 1 日 2 回　p.o	3～4 週 1 コース	
ドセタキセル	40mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	胃がん HER+Cape+CDDP 療法			番号	SST-12
適 応	治癒切除不能・進行再発胃がん（HER2 2＋以上）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div	3 週 1 コース 繰り返し	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div		
カペシタビン	2000mg/㎡/分 2	第 1(夕)～15(朝)日	p.o（14 日間）		

レジメン	胃がん HER+S-1 療法			番号	SST-13
適 応	切除不能・進行再発胃がん（HER2 2＋以上）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	40～60mg/回 1 日 2 回　p.o	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg （初回のみ） 6mg/kg （2 回目以降）	第 1 日	div 初回 90 分 2 回目以降 30 分		

レジメン	胃がん SOX（100）療法			番号	SST-14
適 応	切除不能 進行・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オキサリプラチン	100mg/㎡	第 1 日	div 2 時間	3 週 1 コース	
S-1	80mg/㎡	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	胃がん RAM＋PTX 療法			番号	SST-15
適 応	切除不能 進行・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	8mg/kg	第 1,15 日	div 初回 60 分 2 回目以降 30 分	4 週 1 コース	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div 1 時間		

レジメン	胃がん RAM 単剤療法			番号	SST-16
適 応	切除不能 進行・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	8mg/kg	第 1,15 日	div 初回 60 分 2 回目以降 30 分	4 週 1 コース	

レジメン	胃がん CAPOX 療法			番号	SST-17
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カペシタビン	2000mg/㎡	14 日間	p.o.（分 2）	3 週 1 コース 術後補助化学療法の場合、半年間	
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		

レジメン	胃がん Nivo 療法（2 週間ごと）			番号	SST-18
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	胃がん weekly　nabPTX 療法			番号	SST-19
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	胃がん RAM＋weekly　nabPTX 療法			番号	SST-20
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	8mg/kg	第 1,15 日	div 初回 60 分 2 回目以降 30 分	4 週 1 コース	
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	胃がん CAPOX+HER 療法			番号	SST-21
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div	3 週 1 コース	
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div		
カペシタビン	2000mg/㎡/分 2	第 1～14 日	p.o (14 日間)		

レジメン	胃がん エンハーツ療法			番号	SST-22
適 応	HER2 陽性　進行再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エンハーツ	6.4mg/ kg	第 1 日	div	3 週 1 コース 減量時の投与量 6.4mg/ kg→5.4mg/ kg→ 4.4mg/ kg→中止	

レジメン	胃がん Nivo+SOX（100）療法			番号	SST-23
適 応	HER2 陰性治癒切除不能胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80mg～120mg/日	第 1～14 日	p.o.	3 週 1 コース	
オプジーボ	360mg/body	第 1 日	div		
オキサリプラチン	100mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	胃がん Nivo+CAPOX 療法			番号	SST-24
適 応	HER2 陰性治癒切除不能胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与薬剤名	
カペシタビン	2000mg/㎡	第 1～14 日	p.o.	3 週 1 コース	
オプジーボ	360mg/body	第 1 日	div		
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	胃がん Nivo＋FOLFOX 療法			番号	SST-25
適 応	HER2 陰性治癒切除不能胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div		
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	大腸がん CPT-11 単独療法			番号	SCO-03
適 応	切除不能 進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	大腸がん Cet 単剤療法			番号	SCO-17
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （2 回目以降）	第 1 日	div （初回 120 分、 2 回目以降 60 分）	1 週毎繰り返し	

レジメン	大腸がん Cet+Biweekly　CPT-1 併用療法			番号	SCO-18
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （2 回目以降）	第 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43 日	div （初回 120 分、2 回目以降 60 分）	7 週 1 コース アービタックス 1 週毎繰り返し	
トポテシン	150mg/㎡	第 1, 15, 29 日	div(90 分)	トポテシン 2 週ごと 3 回投与後、3 週休薬	

レジメン	大腸がん CAPOX 療法			番号	SCO-21
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
カペシタビン	*2000mg/㎡	第 1～14 日 第 1 日目夕～第 15 日目朝まで 14 日間	p.o. （分 2）	3 週 1 コース *体表面積 1.36 ㎡未満 1200mｇ/回 1.36 ㎡以上～1.66 ㎡未満 1500mｇ/回 1.66 ㎡以上～1.96 ㎡未満 1800mｇ/回 1.96 ㎡以上　2100mｇ/回	
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		

レジメン	大腸がん CAPOX+Bev 療法			番号	SCO-22
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
カペシタビン	*2000mg/㎡	第 1～14 日 第 1 日目夕～第 15 日目朝まで 14 日間	p.o. （分 2）	3 週 1 コース *体表面積 1.36 ㎡未満　1200mｇ/回 1.36 ㎡以上～1.66 ㎡未満 1500mｇ/回 1.66 ㎡以上～1.96 ㎡未満 1800mｇ/回 1.96 ㎡以上　2100mｇ/回	
ベバシズマブ	7.5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		

レジメン	大腸がん IRIS 療法			番号	SCO-23
適　応	切除不能　進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
トポテシン	125mg/㎡	第 1,15 日	div 2 時間	4 週 1 コース 繰り返し	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	大腸がん Cet＋FOLFIRI 療法			番号	SCO-26
適　応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （２回目以降）	第 1，8 日	div （初回 120 分、2 回目以降 60 分）	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん Pani 単剤療法			番号	SCO-28
適　応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	d iv 60 分	2 週 1 コース	

レジメン	大腸がん Pani＋FOLFIRI 療法			番号	SCO-31
適　応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	div 60 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん Cet＋mFOLFOX6 療法			番号	SCO-33
適 応	切除不能・進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （２回目以降）	第 1，8 日	div （初回 120 分、 ２回目以降 60 分）	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 オキサリプラチンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間		

レジメン	大腸がん SOX（130）+Bev 療法			番号	SCO-34
適 応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.	3 週 1 コース *	
ベバシズマブ	7.5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		

レジメン	大腸がん Pani+IRIS 療法			番号	SCO-36
適 応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.	4 週 1 コース *	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1,15 日	div　60 分		
トポテシン	125mg/㎡	第 1,15 日	div 2 時間		

レジメン	大腸がん RAM+FOLFIRI 療法			番号	SCO-37
適 応	切除不能　進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	8mg/kg	第 1 日	div 初回 60 分 2 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
トポテシン	180mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン 投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん SIRB 療法			番号	SCO-38
適 応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.	4 週 1 コース *	
ベバシズマブ	7.5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 90 分		

レジメン	大腸がん FOLFOXIRI 療法			番号	SCO-39
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	165mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間) オキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	3200mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	大腸がん FOLFOXIRI+Bev 療法			番号	SCO-40
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ベバシズマブ	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
トポテシン	165mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間) オキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	3200mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	大腸がん TAS102+Bev 療法			番号	SCO-41
適 応	切除不能進行再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ロンサーフ	35mg/㎡/回 1 日 2 回	第 1～5 日 第 8～12 日	p.o.	4 週 1 コース	
ベバシズマブ	5mg/kg	第 1,15 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		

レジメン	大腸がん PER+HER 療法			番号	SCO-42
適 応	がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ハーセプチン	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	大腸がん SOX（130）療法			番号	SCO-43
適 応	切除不能 進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オキサリプラチン	130mg/㎡	第 1 日	div 2 時間	3 週 1 コース	
S-1	80mg/㎡	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	膵がん GEM 療法			番号	SPA-01
適 応	切除不能 転移・再発膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	FOLFIRINOX 療法			番号	SPA-02
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間) トポテシンと 同時投与		
トポテシン	180mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	胆道がん GEM 療法			番号	SBI-01
適 応	切除不能 転移・再発胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

《産婦人科》

レジメン	PTX 単剤療法			番号	GOV-01
適　応	進行卵巣がん、臨床的 NED 症例の維持化学療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	180mg/㎡	第 1 日	div	3-4 週休薬 原則 12 コース	

レジメン	CBDCA ＋ CPT-11 療法			番号	GOV-02
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div	2 週休薬	
トポテシン	50mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	TC 療法			番号	GOV-03
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3-4 週休薬	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	DC 療法			番号	GOV-04
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	70mg/㎡	第 1 日	div	3-4 週休薬	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	CPT-11 療法			番号	GOV-05
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1,15,29 日	div	3 週休薬	

レジメン	CPT-11+nedaplatin 療法			番号	GOV-06
適 応	卵巣がん、カルボプラチンにアレルギー反応を示す症例				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	50mg/㎡	第 1,8,15 日	div(120 分)	2 週休薬 2 コースで効果判定	
アクプラ	80mg/㎡	第 1 日	div(60 分以上)		

レジメン	BEP 療法			番号	GOV-08
適 応	卵巣胚細胞性腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	20mg/㎡	第 1-5 日	div	3～4 週 1 コース 最大 4 コースまで	
エトポシド	100mg/㎡	第 1-5 日	div		
ブレオ	20 mg/㎡ (Max30mg/body)	第 2,9,16 日	div		

レジメン	ドキシル単剤療法			番号	GOV-09
適 応	卵巣がん（再発・薬剤耐性）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドキシル	40～50mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	パクリタキセル+ネダプラチン療法			番号	GOV-10
適 応	卵巣がん、カルボプラチンにアレルギー反応を示す症例				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	180mg/㎡	第 1 日	div	4 週休薬	
アクプラ	80mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	ドセタキセル単剤療法			番号	GOV-11
適 応	卵巣がん維持化学療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	70mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 12 コース	

レジメン	weekly パクリタキセル療法			番号	GOV-12
適　応	進行・再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	1 週休薬	

レジメン	ジェムシタビン(GEM)療法			番号	GOV-13
適　応	再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	TC+Bev 療法			番号	GOV-14
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 6 コース	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div		
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	Bev 単剤療法			番号	GOV-15
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div	3 週 1 コース TC+Bev 療法 6 ｺｰｽ後 16 ｺｰｽ	

レジメン	ドセタキセル+Bev 療法			番号	GOV-16
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	70mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	ドキシル+Bev 療法			番号	GOV-17
適 応	再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドキシル	40mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	TC 療法			番号	GUT-02
適 応	子宮頚がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース カルボプラチンの上限は 400mg/㎡	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	CPT11+nedaplatin 療法			番号	GUT-03
適 応	進行・再発子宮頚がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	50mg/㎡	第 1,8,15 日	div(120 分)	4 週 1 コース	
アクプラ	80mg/㎡	第 1 日	div(60 分以上)		

レジメン	シスプラチン療法			番号	GUT-04
適 応	再発子宮頚がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	50mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	DC 療法			番号	GUT-06
適 応	子宮頚がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div	3-4 週休薬	
カルボプラチン	AUC6 6×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	weeklyCDDP+放射線療法			番号	GUT-07
適 応	子宮頚がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	40mg/㎡	第 1 日	div	1 週 1 コース 放射線療法が終了するまで（4～5 コース）	

レジメン	TC 療法			番号	GEN-01
適 応	子宮体がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	DC 療法			番号	GEN-02
適 応	子宮体がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 6×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	PTX 単剤療法			番号	GEN-03
適 応	子宮体がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	AP 療法			番号	GEN-04
適 応	子宮体がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アドリアシン	60mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
シスプラチン	50mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	アドリアシン単剤療法			番号	GEN-05
適 応	子宮体がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アドリアシン	60mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	

レジメン	Pembro+レンバチニブ療法			番号	GEN-06
適　応	子宮体がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第１日	div	3 週 1 コース レンビマ減量方法 1 段階減量：14mg/日 2 段階減量：10mg/日 3 段階減量：8 又は 4mg/日	
レンビマ	20mg/回 1 日 1 回	第 1 日～21 日	p.o.		

レジメン	腹腔内化学療法			番号	GOT-01
適　応					
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC6 6×(GFR+25)mg	第１日	腹腔内	2 週休薬	

《泌尿器科》

レジメン	M-VAC 療法（CDDP）			番号	UBC-01
適　応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
メソトレキセート	30mg/㎡	第 1,15,22 日	div	４週１コース 2～4 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
エクザール	3mg/㎡	第 2,15,22 日	div		
アドリアシン	30mg/㎡	第 2 日	div		
シスプラチン	70mg/㎡	第 2 日	div		

レジメン	M-VAC 療法（CBDCA）			番号	UBC-02
適　応	尿路上皮がん（シスプラチン不適応症例）　［保険適応なし］				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
メソトレキセート	30mg/㎡	第 1,15,22 日	div	４週１コース 2～4 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
エクザール	3mg/㎡	第 2,15,22 日	div		
アドリアシン	30mg/㎡	第 2 日	div		
カルボプラチン	AUC4.5 4.5×(GFR+25)mg	第 2 日	div		

レジメン	GC 療法（4 週毎　CDDP）			番号	UBC-05
適　応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース 4～6 コース	
シスプラチン	70mg/㎡	第 2 日	div		

レジメン	GC 療法（4 週毎　CBDCA）			番号	UBC-06
適 応	尿路上皮がん（シスプラチン不適応症例）　［保険適応なし］				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース 4～6 コース	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 2 日	div		
レジメン	膀胱内注入療法			番号	UBC-07
適 応	膀胱がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ピノルビン	20mg	1 週～ 1 ヶ月に 1 回	膀注	期間は不定	
レジメン	膀胱内注入療法			番号	UBC-08
適 応	膀胱がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
マイトマイシン	10～20mg	1 週～ 1 ヶ月に 1 回	膀注	期間は不定	
レジメン	GEM+PTX 療法（GP 療法）			番号	UBC-09
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	200mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div		
レジメン	GEM 療法			番号	UBC-10
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	Pembro 療法（3 週間ごと）			番号	UBC-11
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	Div　30 分	3 週 1 コース	

レジメン	Pembro 療法（6 週間ごと）			番号	UBC-12
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	Div　30 分	6 週 1 コース	

レジメン	バベンチオ維持療法			番号	UBC-13
適 応	根治切除不能な尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
バベンチオ	10mg/kg	第 1 日	Div　60 分	2 週 1 コース バベンチオ投与 30 分～60 分前にアセトアミノフェン投与	

レジメン	パドセブ療法			番号	UBC-14
適 応	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パドセブ	1.25mg/kg	第 1,8,15 日	Div　30 分	4 週 1 コース	

レジメン	Nivo 療法（2 週間ごと）			番号	UBC-15
適 応	膀胱全摘後　アジュバント				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース 膀胱全摘後 12 カ月投与	

レジメン	Nivo 療法（4 週間ごと）			番号	UBC-16
適 応	膀胱全摘後　アジュバント				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース 膀胱全摘後 12 カ月	

レジメン	GC 療法（3 週毎　CDDP）			番号	UBC-17
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	3 週 1 コース	
シスプラチン	70mg/㎡	第 2 日	div		

レジメン	GC 療法（3 週毎　CBDCA）			番号	UBC-18
適 応	尿路上皮がん（シスプラチン不適応症例）　［保険適応なし］				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 2 日	div		

レジメン	BEP 療法			番号	UTC-01
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	20mg/㎡	第 1-5 日	div	2-3 コース 1st line	
エトポシド	100mg/㎡	第 1-5 日	div		
ブレオ	30mg/body	第 1,8,15 日	div		

レジメン	TIP 療法			番号	UTC-02
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	210mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
イホマイド	1.5g/㎡	第 2-5 日	div		
シスプラチン	20mg/㎡	第 2-5 日	div		

レジメン	IDP 療法			番号	UTC-03
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース 3～4 コース	
イホマイド	1.5g/㎡	第 1 - 3 日	div		
カルボプラチン	300mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	VeIP 療法			番号	UTC-04
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エクザール	0.11mg/kg	第 1,2 日	div	3 週 1 コース 3～4 コース	
イホマイド	1.2g/㎡	第 1 -5 日	div		
シスプラチン	20mg/㎡	第 1-5 日	div		

レジメン	VIP 療法			番号	UTC-05
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
エトポシド	75mg/㎡	第 1-5 日	div	3 週 1 コース 3～4 コース	
イホマイド	1.2g/㎡	第 1-5 日	div		
シスプラチン	20mg/㎡	第 1-5 日	div		

レジメン	CBDCA 単剤療法			番号	UTC-06
適　応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC7 7×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース 2 コース	

レジメン	DP 療法			番号	UPC-02
適　応	ホルモン抵抗性前立腺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 最低 4 コース以上	

レジメン	カバジタキセル療法			番号	UPC-05
適　応	去勢抵抗性前立腺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ジェブタナ	25mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
プレドニン	10mg/日（分 2）	第 1～21 日	p.o.		

レジメン	ダロルタミド＋DOC 療法			番号	UPC-06
適　応	遠隔転移を有する前立腺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース DOC は 6 サイクルまで ダロルタミド：減量方法 600mg/日→中止	
ダロルタミド	1200mg/日（分 2）	第 1～21 日	p.o.		

レジメン	Nivo 療法（2 週間ごと）			番号	UKC-03
適　応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	UKC-04
適　応	化学療法未治療の根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	Pembro+Axi 療法（3 週間ごと）			番号	UKC-05
適　応	治療歴のない根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース アキシチニブ：忍容性が認められる場合、1 回 7mg →10mg に増量できる。副作用が見られた場合は減量、休薬又は中止。減量して投与を継続する場合は、副作用の症状、重症度等に応じて 1 回 3mg →1 回 2mg に減量する。	
アキシチニブ	5mg/回 1 日 2 回	第 1 日～21 日	p.o.		

レジメン	Nivo 療法（4 週間ごと）			番号	UKC-06
適　応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	Nivo+Cabo 療法（2 週間ごと）			番号	UKC-07
適　応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース カボメティクス減量方法 1 段階減量：20mg/日 2 段階減量：20mg/日を隔日投与 20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与中止	
カボメティクス	40mg/日	第 1 日～14 日	p.o.		

レジメン	Pembro+レンバチニブ療法			番号	UKC-08
適　応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース レンビマ減量方法 1 段階減量：14mg/日 2 段階減量：10mg/日 3 段階減量：8 又は 4mg/日	
レンビマ	20mg/回 1 日 1 回	第 1 日～21 日	p.o.		

レジメン	Pembro 療法（3 週間ごと）			番号	UKC-09
適　応	腎がん術後				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	Div	3 週 1 コース	

レジメン	Pembro 療法（6 週間ごと）			番号	UKC-10
適　応	腎がん術後				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	Div	6 週 1 コース	

レジメン	Pembro+Axi 療法（6 週間ごと）			番号	UKC-11
適　応	治療歴のない根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	div	6 週 1 コース アキシチニブ：忍容性が認められる場合、1 回 7mg →10mg に増量できる。 副作用が見られた場合は減量、休薬又は中止。減量して投与を継続する場合は、副作用の症状、重症度等に応じて 1 回 3mg →1 回 2mg に減量する。	
アキシチニブ	5mg/回 1 日 2 回	第 1 日～42 日	p.o.		

レジメン	Nivo+Cabo 療法（4 週間ごと）			番号	UKC-12
適　応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース カボメティクス減量方法 1 段階減量：20mg/日 2 段階減量：20mg/日を隔日投与 20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与中止	
カボメティクス	40mg/日	第 1 日～28 日	p.o.		

レジメン	TIP 療法			番号	UPE-02
適　応	陰茎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3～4 週 1 コース	
イホマイド	1.2g/㎡	第 2-4 日	div		
シスプラチン	25mg/㎡	第 2-4 日	div		

《呼吸器内科》

レジメン	CPT-11 単剤療法			番号	RLC-02
適　応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	DOC 単剤療法			番号	RLC-03
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	VNR 単剤療法			番号	RLC-05
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ロゼウス	20～25mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	CBDCA+ PTX weekly 療法			番号	RLC-06
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC4～6 4～6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	4 週 1 コース	
パクリタキセル	70mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	CBDCA+PTX 療法			番号	RLC-07
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5～6 5～6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3～4 週 1 コース	
パクリタキセル	200mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	CDDP+VP-16 (PVP)療法			番号	RLC-08
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div	3～4 週 1 コース	
エトポシド	100mg/㎡	第 1-3 日	div		

レジメン	CBDCA+VP-16 療法			番号	RLC-10
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3～4 週 1 コース	
エトポシド	80mg/㎡	第 1-3 日	div		

レジメン	CDDP+VNR 療法			番号	RLC-11
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ロゼウス	25mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	CDDP+CPT-11 療法			番号	RLC-15
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	60mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
トポテシン	60mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	CBDCA+CPT-11 療法			番号	RLC-16
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	4 週 1 コース	
トポテシン	60mg/㎡	第 1,8,15 日	div		
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	Bev 単剤療法			番号	RLC-24
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分	3 週 1 コース 腫瘍の増悪が 見られるまで	

レジメン	weekly CBDCA+PTX と同時胸部放射線療法			番号	RLC-25
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC2 2×(Ccr+25)mg	第 1,8,15 22,29,36 日	div	6 週 1 コース 放射線治療： 1 回 2 Gy　週 5 日　計 60 Gy 放射線治療終了後 3 週間休薬	
パクリタキセル	40mg/㎡	第 1,8,15 22,29,36 日	div		

レジメン	PEM 単剤療法			番号	RLC-27
適　応	非小細胞肺がん（扁平上皮がんを除く）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div	3 週 1 コース 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	

レジメン	CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-28
適　応	非小細胞肺がん（扁平上皮がんを除く）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第１日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div		

レジメン	CDDP+PEM 療法			番号	RLC-29
適　応	非小細胞肺がん（扁平上皮がんを除く）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	75 mg/㎡	第１日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div		

レジメン	AMR 単剤療法			番号	RLC-30
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルセド	40mg/㎡	第 1～3 日	div	3～4 週 1 コース	

レジメン	Nogitecan 療法			番号	RLC-31
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ハイカムチン	1.0mg/㎡	第 1～5 日	div	3～4 週 1 コース PD になるまで繰り返す (間質性肺炎既往患者の 2 次治療)	

レジメン	CDDP+PEM+Bev 療法			番号	RLC-33
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	75mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	CBDCA+PEM+Bev 療法			番号	RLC-34
適　応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC６ 6×(Ccr+25)mg	第１日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日 p.o.開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div		
ベバシズマブ	15mg/kg	第１日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	PEM+Bev 維持療法			番号	RLC-35
適　応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div	3 週 1 コース CDDP（CBDCA）+PEM+Bev 療法 4～6 コース施行後のメンテナンスとして施行 ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12： 9 週毎に 1 mg/回筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ベバシズマブ	15mg/kg	第１日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	CBDCA+weeklyPTX+Bev 療法			番号	RLC-36
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	d iv	4 週 1 コース	
パクリタキセル	70mg/㎡	第 1,8,15 日	d iv		
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	CBDCA+S-1 療法			番号	RLC-37
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース *体表面積 1.25 ㎡未満　80mｇ分 2 1.25 ㎡以上～1.5 ㎡未満 100mｇ分 2 1.5 ㎡以上　120mｇ分 2	
S-1	*右記	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-39
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース	
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	Nivo 療法（2 週間ごと）		番号	RLC-40
適 応	非小細胞肺がん			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース

レジメン	DOC+RAM 療法			番号	RLC-41
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	10mg/kg	第 1 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	60 分		

レジメン	Pembro 療法（3 週間ごと）			番号	RLC-42
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	30 分	3 週 1 コース	

レジメン	低用量 CBDCA と同時胸部放射線療法			番号	RLC-43
適 応	高齢者局所限局型非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	30mg/㎡	第 1 日	div	平日のみ合計 20 回 放射線治療：30 回 週 5 日　計 60 Gy	

レジメン	Atezo 療法			番号	RLC-44
適 応	小細胞肺がん/非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	

レジメン	イミフィンジ療法（化学放射線療法後）			番号	RLC-45
適 応	切除不能Ⅲ期非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	60 分	4 週 1 コース 投与期間 12 カ月 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	

レジメン	Pembro+CBDCA+PTX 療法			番号	RLC-46
適　応	扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		
パクリタキセル	200mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Pembro+CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-47
適　応	扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	Pembro+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-48
適　応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Pembro+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-49
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
シスプラチン	75 mg/㎡	第 1 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Pembro+PEM 維持療法			番号	RLC-50
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Atezo+CBDCA+PTX+Bev 療法			番号	RLC-51
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第１日	初回 60 分、 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース 4 コースまで	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第１日	d iv		
パクリタキセル	200mg/㎡	第１日	d iv		
ベバシズマブ	15mg/kg	第１日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	Atezo+Bev 維持療法			番号	RLC-52
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第１日	div	3 週 1 コース	
ベバシズマブ	15mg/kg	第１日	div		

レジメン	CDDP+VNR と同時胸部放射線療法			番号	RLC-53
適 応	切除不能局所限局型非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第１日	div	4 週 1 コース	
ロゼウス	20mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	Atezo+CBDCA+VP-16 療法			番号	RLC-54
適　応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第１日	初回 60 分、2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 5×(Ccr+25)mg	第１日	ｄiv		
エトポシド	100mg/㎡	第 1～3 日	ｄiv		

レジメン	Atezo+CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-55
適　応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第１日	初回 60 分、2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第１日	div		
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	Atezo+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-56
適　応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第１日	初回 60 分、2 回目以降 30 分	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第１日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div		

レジメン	Atezo+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-57
適 応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分、2 回目以降 30 分	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
シスプラチン	75mg/㎡	第 1 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Atezo+PEM 維持療法			番号	RLC-58
適 応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Pembro 療法（6 週間ごと）			番号	RLC-59
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	Div　30 分	6 週 1 コース	

レジメン	Nivo 療法（4 週間ごと）			番号	RLC-60
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	RAM+EGFR-TKI 療法			番号	RLC-61
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	10mg/kg	第 1,15 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	4 週 1 コース	
EGFR-TKI	添付文書に従う	第 1～28 日	p.o.		

レジメン	Nivo+Ipi+CBDCA+PTX 療法			番号	RLC-62
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	360mg/body	第 1,22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1,22 日	div		
パクリタキセル	200mg/㎡	第 1,22 日	div		

レジメン	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-63
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	360mg/body	第 1,22 日	div	6 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1,22 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1,22 日	div		

レジメン	Nivo+Ipi+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-64
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	360mg/body	第 1,22 日	div	6 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
シスプラチン	75mg/㎡	第 1,22 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1,22 日	div		

レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	RLC-65
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	360mg/body	第 1,22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	weeklynabPTX 療法			番号	RLC-66
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アブラキサン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	イミフィンジ+CDDP+VP-16 療法			番号	RLC-67
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	d iv	3 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	d iv		
エトポシド	100mg/㎡	第 1～3 日	d iv		

レジメン	イミフィンジ+CBDCA+VP-16 療法			番号	RLC-68
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第１日	ｄｉｖ	3 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	
カルボプラチン	AUC 5×(Ccr+25)mg	第１日	ｄｉｖ		
エトポシド	100mg/㎡	第 1～3 日	ｄｉｖ		

レジメン	イミフィンジ維持療法			番号	RLC-69
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第１日	ｄｉｖ	4 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	

レジメン	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-70
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イジュド	75mg/body	第１日	div	3 週 1 コース 4 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
イミフィンジ	1500 mg/body	第１日	div		
カルボプラチン	AUC 6×(Ccr+25)mg	第１日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第１日	div		

レジメン	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-71
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イジュド	75mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
イミフィンジ	1500 mg/body	第 1 日	div		
シスプラチン	75mg/㎡	第 1 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+PEM 療法			番号	RLC-72
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イジュド	75mg/body	第 29 日	div	8 週 1 コース（RLC-70,71 の 5,6 コース目に該当） 1 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
イミフィンジ	1500 mg/body	第 1,29 日	div		
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1,29 日	div		

レジメン	イミフィンジ+PEM 療法			番号	RLC-73
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イミフィンジ	1500 mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース (RLC-70,71 の 7 コース目以降に該当) 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-74
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イジュド	75mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	
イミフィンジ	1500 mg/body	第 1 日	div		
カルボプラチン	AUC 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		
アブラキサン	100mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	イミフィンジ+イジュド療法			番号	RLC-75
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イジュド	75mg/body	第 1,29 日	div	8 週 1 コース(RLC-74 の 5,6 コース目に該当) 1 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	
イミフィンジ	1500 mg/body	第 1,29 日	div		

レジメン	イミフィンジ療法			番号	RLC-76
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500 mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース（RLC-74 の 7 コース目以降に該当） 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	

レジメン	CDDP+PEM 療法			番号	RMM-01
適 応	悪性胸膜中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	75 mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ペメトレキセド	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	Nivo 療法（2 週間ごと）			番号	RMM-02
適 応	悪性中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	Nivo 療法（4 週間ごと）			番号	RMM-03
適 応	悪性中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	RMM-04
適 応	悪性胸膜中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	360mg/body	第 1,22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	ADOC 療法			番号	RTH-01
適 応	胸腺腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アドリアシン	40mg/㎡	第 1 日	div	3-4 週 1 コース オンコビン 1 日 2mg まで アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
シスプラチン	50mg/㎡	第 1 日	div		
オンコビン	0.6mg/㎡	第 3 日	div		
エンドキサン	700mg/㎡	第 4 日	div		

レジメン	PAC 療法			番号	RTH-02
適 応	胸腺腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アドリアシン	50mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
シスプラチン	50mg/㎡	第 1 日	div		
エンドキサン	500mg/㎡	第 1 日	div		

《消化器内科》

レジメン	MTX+5FU 交代療法			番号	◎DST-01
適　応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
メソトレキセート	30～100mg/㎡	第 1 日	div(15 分)	7～14 日 1 コース	
5-FU	600mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
ロイコボリン	10mg/㎡/回	メソトレキセート投与 24 時間後より 6 時間ごとに計 6 回			

レジメン	weekly PTX 療法			番号	◎DST-02
適　応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div(1 時間)	4 週 1 コース	

レジメン	S-1＋CPT-11 療法			番号	◎DST-03
適　応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80mg/㎡(分 2)	第 1～21 日	p.o.	5 週 1 コース	
トポテシン	80mg/㎡	第 1,15 日	div(2 時間)		

レジメン	S-1＋CDDP 療法			番号	DST-04
適　応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80mg/㎡(分 2)	第 1～21 日	p.o.	5 週 1 コース	
シスプラチン	60mg/㎡	第 8 日	div(2 時間)		

レジメン	CPT-11+CDDP 療法			番号	DST-05
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	70mg/㎡	第 1,15 日	div(2 時間)	4 週 1 コース	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		

レジメン	5-FU 療法			番号	DST-06
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div(24 時間)	4 週 1 コース	

レジメン	CPT-11+CDDP Biweekly 療法			番号	DST-07
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	60mg/㎡	第 1,15 日	div	4 週 1 コース	
シスプラチン	30mg/㎡	第 1,15 日	div		

レジメン	nabPTX 療法			番号	DST-08
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アブラキサン	260mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	5-FU+CDDP 療法			番号	DST-09
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	4 週 1 コース	
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div(24 時間)		

レジメン	l-LV+5FU(RPMI)療法			番号	DST-10
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	250mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div (2 時間)	8 週 1 コース	
5-FU	600mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div(全開)		

レジメン	mFOLFOX6 療法			番号	DST-11
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	l-LV+5FU(RPMI)療法			番号	◎DCO-01
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	250mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div(2 時間)	8 週 1 コース	
5-FU	600mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div(全開)		

レジメン	mFOLFOX6 療法			番号	DCO-02
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	FOLFIRI 療法			番号	DCO-03
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
トポテシン	180mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	CPT-11+5-FU+ 1 -LV （IFL） 療法			番号	◎DCO-04
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8 日	div(2 時間)	3 週 1 コース	
アイソボリン	10mg/㎡	第 1,8 日	div(15 分)		
5-FU	500mg/㎡	第 1,8 日	div(全開)		

レジメン	CPT-11 療法			番号	DCO-05
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週サイクルで 2～3 回投与、その後 2～3 週休薬	

レジメン	mFOLFOX6＋Bev 療法			番号	DCO-06
適 応	切除不能・転移性進行大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベバシズマブ	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	FOLFIRI＋Bev 療法			番号	DCO-08
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベバシズマブ	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	Pani＋CPT-11 療法			番号	DCO-10
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div	14 週 1 コース	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	Pani＋mFOLFOX6 療法			番号	DCO-11
適　応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/Kg	第 1 日	div(60 分)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	5-FU 動注療法			番号	DCO-12
適　応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
5-FU	1000mg/㎡	第 1 日	動注	毎週繰り返し	

レジメン	DOC 療法			番号	DES-01
適　応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	70mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	3 週 1 コース	

レジメン	5-FU+Nedaplatin 療法			番号	DES-02
適　応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	90mg/㎡	第 1 日	div(90 分)	4 週 1 コース	
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div(24 時間)		

レジメン	5-FU+Nedaplatin+RT 療法			番号	DES-03
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	90mg/㎡	第 1,36 日	div(90 分)	9 週 1 コース	
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日 第 36～40 日	div(24 時間)		
RT	2Gy/日	5 日/週、6 週間			

レジメン	5-FU+CDDP 療法			番号	DES-04
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	4 週 1 コース	
5-FU	800mg/㎡	第 1～5 日	div(24 時間)		

レジメン	5-FU+CDDP+RT 療法			番号	DES-05
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	70mg/㎡	第 1,29 日	div(2 時間)	8 週 1 コース	
5-FU	700mg/㎡	第 1～4 日 第 29～32 日	div(24 時間)		
RT	2Gy/日	5 日/週、6 週間			

レジメン	weekly PTX 療法			番号	DES-06
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	100mg/㎡	第 1,8,15, 22,29,36 日	div(1 時間)	8 週 1 コース	

レジメン	GEM 療法			番号	DPA-01
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div(30 分)	4 週 1 コース	

レジメン	GEM+S-1 療法（GS 療法）			番号	DPA-02
適 応	進行膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース *体表面積 1.25 ㎡未満　60ｍｇ/日 1.25 ㎡以上～1.5 ㎡未満　80ｍｇ/日 1.5 ㎡以上　100ｍｇ/日	
S-1	*右記	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	FOLFIRINOX 療法			番号	DPA-04
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間) トポテシンと同時投与		
トポテシン	180mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	GEM+エルロチニブ療法			番号	DPA-05
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	
タルセバ	100mg/日	第 1～28 日	p.o.		

レジメン	nabPTX+GEM 療法			番号	DPA-06
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アブラキサン	125mg/㎡	第 1,8,15 日	div(30 分)	4 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div(30 分)		

レジメン	オニバイド+5-FU/LV 療法			番号	DPA-07
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オニバイド	70mg/㎡	第 1 日	div(90 分)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	ModifiedFOLFIRINOX 療法			番号	DPA-08
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間) トポテシンと同時投与		
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	GEM+放射線療法			番号	DPA-09
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	250～600mg/㎡	第 1 日	div(30 分)	1 週 1 コース 放射線治療中毎週投与 RT　50～54Gy	

レジメン	GEM 療法			番号	DBI-01
適　応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div(30 分)	4 週 1 コース	

レジメン	GEM+S-1 療法			番号	DBI-03
適　応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース *体表面積 1.25 ㎡未満 60mｇ/日 1.25 ㎡以上～1.5 ㎡未満 80mｇ/日 1.5 ㎡以上　100mｇ/日	
S-1	65 mg/㎡*右記	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	GEM+CDDP 療法			番号	DBI-04
適　応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	
シスプラチン	25 mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	イミフィンジ+GEM+CDDP 療法			番号	DBI-05
適　応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 8 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div		
シスプラチン	25 mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	イミフィンジ療法			番号	DBI-06
適　応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	ｄｉｖ	4 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	

レジメン	低用量 CDDP/5-FU 併用持続動注療法 (6 時間)			番号	DHC-01
適　応	肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	10mg/body	第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日	動注（1 時間） 肝動脈留置 カテーテルより	4 週 1 コース	
5-FU	250mg/body	第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日	動注（5 時間） 肝動脈留置 カテーテルより		

レジメン	低用量 CDDP/5-FU 併用持続動注療法 (24 時間)			番号	DHC-02
適　応	肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	10mg/body	第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日	動注（1 時間） 肝動脈留置 カテーテルより	4 週 1 コース	
5-FU	500mg/body	第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日	動注(23 時間) 肝動脈留置 カテーテルより		

レジメン	RAM 療法			番号	DHC-03
適　応	がん化学療法後に増悪した血清 AFP 値が 400ng/mL 以上の切除不能な肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
サイラムザ	8mg/kg	第 1 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	2 週 1 コース	

レジメン	Atezo+Bev 併用療法			番号	DHC-04
適　応	切除不能な肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース	
アバスチン	15mg/kg	第 1 日	div		

《脳神経外科》

レジメン	ロイコボリン救援 MTX 大量療法			番号	NML-01
適 応	原発性中枢性悪性リンパ腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
メソトレキセート	3.5g/㎡	第 2 日	div(4 時間)	10 日～2 週ごとに繰り返すことができる (3 コースまで)	
ロイコボリン	15mg/回 4 時間毎に 1 日 6 回	第 3～6 日	iv (MTX 投与終了 12 時間後から)		

レジメン	R-MTX 大量療法			番号	NML-02
適 応	中枢性悪性リンパ腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
リツキサン	375mg/㎡	第 1 日	div	2 週 1 コース	
メソトレキセート	3.5g/㎡	第 2 日	div(4 時間)		
ロイコボリン	15mg/回 4 時間毎に 1 日 6 回	第 3～6 日	iv (MTX 投与終了 12 時間後から)		

レジメン	(2 ｺｰｽ目以降)テモダール療法			番号	NMG-01
適 応	悪性神経膠腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テモダール	150mg/㎡	第 1～5 日	Div(90 分)	4 週 1 コース　2.5 mg/ml 150m g/㎡を 1 日 1 回 5 日間投与し、23 日間休薬。この 28 日を 1 コースとする。 次コースから 1 回 200m g/㎡に増量することが出来る。	

レジメン	(初回)テモダール療法			番号	NMG-02
適 応	悪性神経膠腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テモダール	75mg/㎡	第1～42 日	Div(90 分)	放射線との併用にて 75mg/㎡を 1 日 1 回 42 日間投与し、4 週間休薬。	

レジメン	Bev 療法(bi-weekly)			番号	NMG-03
適 応	悪性神経膠腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	10mg/kg	第 1 日	Div 30 分	2 週 1 コース	

レジメン	放射線併用テモダール+Bev 療法			番号	NMG-04
適 応	悪性神経膠腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	10mg/kg	第 1.15. 29.42 日	Div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分	42 日 1 コース 内服不可の場合はテモダール div 使用 テモダールとアバスチンの初回投与日と最終投与日は同日とする テモダールは放射線療法の終了が延期される場合最大 49 日継続投与可	
テモダール	75mg/㎡	第 1～42 日	p.o.		

レジメン	(初発維持)テモダール+Bev 療法			番号	NMG-05
適 応	悪性神経膠腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	10mg/kg	第 1.15 日	Div 30 分	28 日 1 コース 6 コースまで 内服不可の場合はテモダール div 使用 テモダールは 1 コース目は 150mg/㎡、2 コース目以降忍容性が確認される場合 200mg/㎡に増量可	
テモダール	150～ 200mg/㎡	第 1～5 日	p.o.		

レジメン	Bev 療法(tri-weekly)			番号	NMG-06
適　応	悪性神経膠腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	15mg/kg	第 1 日	Div 30 分	21 日 1 コース	

《腫瘍内科》

レジメン	ドキシル+CBDCA 療法			番号	OOV-01
適 応	再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドキシル	30mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	Dose　dense　TC 療法			番号	OOV-02
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	TC 脱感作療法（CBDCA 過敏反応既往患者）			番号	OOV-03
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍 →100 倍→10 倍→原液	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 2 日	div		

レジメン	wTC 療法			番号	OOV-04
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 2×(Ccr+25)mg	第 1,8,15 日	div		

レジメン	CBDCA+GEM 療法			番号	OOV-05
適 応	再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1.8 日	div	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC4 4×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	CBDCA+GEM+Bev 療法			番号	OOV-06
適 応	再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1.8 日	div		
カルボプラチン	AUC4 4×(GFR+25)mg	第 1 日	div		

レジメン	CBDCA 脱感作+GEM 療法 （CBDCA 過敏反応既往患者）			番号	OOV-07
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1.8 日	div	3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍 →100 倍→10 倍→原液	
カルボプラチン	AUC4 4×(GFR+25)mg	第 2 日	div		

レジメン	CBDCA 脱感作+GEM+Bev 療法 （CBDCA 過敏反応既往患者）			番号	OOV-08
適 応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div	3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍 →100 倍→10 倍→原液	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1.8 日	div		
カルボプラチン	AUC4 4×(GFR+25)mg	第 2 日	div		

レジメン	TC 脱感作+Bev 療法 （CBDCA 過敏反応既往患者）			番号	OOV-09
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	175mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍 →100 倍→10 倍→原液 6 コースまで	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div		
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 2 日	div		

レジメン	CBDCA 脱感作+Bev 療法 （CBDCA 過敏反応既往患者）			番号	OOV-10
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍 →100 倍→10 倍→原液 6 コースまで	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	wTC 脱感作療法（CBDCA 過敏反応既往患者）			番号	OOV-11
適　応	卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍 →100 倍→10 倍→原液	
カルボプラチン	AUC5 2×(GFR+25)mg	第 2,9,16 日	div		

レジメン	ノギテカン単独療法			番号	OOV-12
適　応	プラチナ抵抗性再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
ハイカムチン	1.5mg/㎡	第 1～5 日	div	3 週 1 コース 1 段階減量 →1.25mg/㎡ 2 段階減量 →1.0mg/㎡	

レジメン	ノギテカン+Bev 療法			番号	OOV-13
適 応	プラチナ抵抗性再発卵巣がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ハイカムチン	1.5mg/㎡	第 1～5 日	div	3 週 1 コース 1 段階減量 →1.25mg/㎡ 2 段階減量 →1.0mg/㎡	
ベバシズマブ	15mg/kg	第 1 日	Div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3回目以降30分		

レジメン	PER+HER+PTX 療法			番号	OBR-01
適 応	進行再発・切除不能乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パージェタ	840mg/body（初回のみ） 420mg/body(2 回目以降)	第 1 日	div	3 週 1 コース	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1.8.15 日	div		

レジメン	Ipi 療法			番号	OMM-01
適 応	悪性黒色腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ヤーボイ	3mg/kg	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	

レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	OMM-02
適 応	悪性黒色腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	80mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	
ヤーボイ	3mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	Nivo 療法			番号	OMM-03
適 応	悪性黒色腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	MTX 髄注療法			番号	OME-01
適 応	がん性髄膜炎				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
メソトレキセート	10mg/body	第 1 日	髄注	3 日 2 回/週×4 週 1 回/週×4～8 週 1 回/2 週	

レジメン	CDDP+5-FU+セツキシマブ療法			番号	OHN-02
適 応	頭頸部がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡（2 回目以降）	第 1 日	div	3 週 1 コース 6 コースまで 6 コース終了後はセツキシマブのみ	
5-FU	1000mg/㎡	第 1-4 日	div		
シスプラチン	100mg/ ㎡	第 1 日	Div 側管		

レジメン	CDDP　3 週ごと+放射線療法			番号	OHN-03
適 応	頭頸部がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	100mg/ ㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	CDDP　毎週+放射線療法			番号	OHN-04
適 応	頭頸部がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	40mg/ ㎡	第 1 日	div	1 週 1 コース	

レジメン	Pembro 療法（3 週間ごと）			番号	MSH-01
適 応	MSI-H 腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	Div　30 分	3 週 1 コース	

レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	MSH-02
適 応	MSI-High を有する結腸・直腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで 以後は Nivo 単独療法	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		

レジメン	Nivo 療法（2 週間ごと）			番号	MSH-03
適 応	MSI-High を有する結腸・直腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	

レジメン	Nivo 療法（4 週間ごと）			番号	MSH-04
適 応	MSI-High を有する結腸・直腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	Pembro 療法（6 週間ごと）			番号	MSH-05
適 応	MSI-H 腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	Div　30 分	6 週 1 コース	

レジメン	CHOP 療法			番号	ONH-01
適 応	非ホジキンリンパ腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アドリアシン	50mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 計 6～8 コース オンコビン 1 日 2mg まで アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
エンドキサン	750mg/㎡	第 1 日	div		
オンコビン	1.4mg/㎡	第 1 日	div		
プレドニン	40or60mg/㎡ (or100mg/body)	第 1～5 日	p.o.		

レジメン	R-CHOP 療法			番号	ONH-02
適 応	非ホジキンリンパ腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
リツキサン	375mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 計 6～8 コース オンコビン 1 日 2mg まで アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	
アドリアシン	50mg/㎡	第 1 または 2 日	div		
エンドキサン	750mg/㎡	第 1 または 2 日	div		
オンコビン	1.4mg/㎡	第 1 または 2 日	div		
プレドニン	40or60mg/㎡ (or100mg/body)	第 1～5 日	p.o.		

レジメン	Rit 単独療法			番号	ONH-03
適 応	非ホジキンリンパ腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
リツキサン	375mg/㎡	第 1 日	div	1 週 1 コース Max 8 コース	

レジメン	weekly PTX 療法			番号	OHS-01
適 応	血管肉腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	80mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	weekly DOC 療法			番号	OHS-02
適 応	血管肉腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	25mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cet 療法			番号	OCO-01
適 応	がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	500mg/㎡	第 1 日	div 初回 2 時間 2 回目以降 1 時間	2 週 1 コース エンコラフェニブ減量方法 1 段階減量：225mg/日 2 段階減量：150mg/日 3 段階減量：投与中止 ビニメチニブ減量方法 1 段階減量：30mg/回 1 日 2 回 2 段階減量：15mg/回 1 日 2 回 3 段階減量：投与中止	
エンコラフェニブ	300mg/日	第 1～14 日	p.o.		
ビニメチニブ	45mg/回 1 日 2 回	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	エンコラフェニブ+Cet 療法			番号	OCO-02
適　応	がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	500mg/㎡	第 1 日	div 初回 2 時間 2 回目以降 1 時間	2 週 1 コース エンコラフェニブ減量方法 1 段階減量：225mg/日 2 段階減量：150mg/日 3 段階減量：投与中止	
エンコラフェニブ	300mg/日	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	IRIS+Bev 療法			番号	OCO-03
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.	4 週 1 コース	
ベバシズマブ	5mg/kg	第 1,15 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		
トポテシン	125mg/㎡	第 1,15 日	div 2 時間		

レジメン	CAPIRI+Bev 療法			番号	OCO-04
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カペシタビン	1600mg/㎡/分 2	第 1～14 日	p.o.	3 週 1 コース	
ベバシズマブ	7.5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		
トポテシン	200mg/㎡	第 1 日	div 90 分		

レジメン	SOX（100）+HER 療法			番号	OST-01
適 応	HER2 陽性治癒切除不能・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トラスツズマブ	8mg/kg（初回のみ） 6mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div 初回 90 分 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
オキサリプラチン	100mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	Nivo 療法（4 週間ごと）			番号	OST-02
適 応	治癒切除不能な進行・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	イミフィンジ療法			番号	OHC-01
適 応	切除不能な肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	d iv	4 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg	

レジメン	イミフィンジ＋イジュド療法			番号	OHC-02
適 応	切除不能な肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース イジュド併用は初回 1 コースのみ 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg、イジュド 4 mg/kg	
イジュド	300mg/body	第 1 日	div		

レジメン	アドリアマイシン(ドキソルビシン)療法			番号	OSS-01
適 応	軟部肉腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アドリアシン	60mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/㎡まで	

レジメン	GEM+CDDP+S-1 療法			番号	OBI-01
適 応	切除不能・再発胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	25mg/㎡	第 1 日	div	2 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1 日	div		
S-1	80 mg/㎡	第 1-7 日	p.o.		

(参考)血管外漏出時の組織障害性に基づく分類　　下線＿＿＿は院内採用

壊死性抗がん剤 vesicant drugs	炎症性抗がん剤 irritant drugs		非壊死性抗がん剤 non-vesicant drugs
抗腫瘍性抗生物質 アクチノマイシンD (コスメゲン) アムルビシン (カルセド) イダルビシン (イダマイシン) エピルビシン (エピルビシン) ダウノルビシン (ダウノマイシン) ドキソルビシン (アドリアシン) ピラルビシン (ピノルビン) マイトマイシンC (マイトマイシン) **抗腫瘍性植物成分** ドセタキセル (ドセタキセル) パクリタキセル (パクリタキセル) パクリタキセル (アブラキサン) ビノレルビン (ロゼウス) ビンクリスチン (オンコビン) ビンデシン (フィルデシン) ビンブラスチン (エクザール) **アルキル化剤** ラニムスチン (サイメリン) **その他の抗腫瘍剤** ミトキサントロン (ノバントロン)	**抗腫瘍性抗生物質** アクラルビシン (アクラシノン) 塩酸ドキソルビシン (ドキシル) **抗腫瘍性植物製剤** イリノテカン (トポテシン) イリノテカン (オニバイド) エトポシド (エトポシド) ノギテカン (ハイカムチン) **アルキル化剤** イホスファミド (イホマイド) カルボコン (エスキノン) シクロホスファミド (エンドキサン) ダカルバジン (ダカルバジン) チオテパ (テスパミン) テモゾロミド (テモダール) カバジタキセル (ジェブタナ) **白金錯体製剤** カルボプラチン (カルボプラチン) シスプラチン (シスプラチン) ネダプラチン (アクプラ) オキサリプラチン (オキサリプラチン) **代謝拮抗剤** ゲムシタビン (ゲムシタビン) フルオロウラシル (5-FU) **分子標的薬** トラスツズマブ　エムタンシン (カドサイラ)	**抗腫瘍性植物製剤・分子標的薬配合体** トラスツズマブ　デルクステカン (エンハーツ)	**抗腫瘍性抗生物質** ブレオマイシン (ブレオ) ペプロマイシン (ペプレオ) **アルキル化剤** ニムスチン (ニドラン) **代謝拮抗剤** エノシタビン (サンラビン) シタラビン (キロサイド) メトトレキサート (メソトレキセート) ペメトレキセド (ペメトレキセド) **酵素製剤** アスパラギナーゼ (ロイナーゼ) インターフェロン インターロイキン **分子標的薬** ベバシズマブ (アバスチン・ベバシズマブ) トラスツズマブ (トラスツズマブ) リツキシマブ (リツキサン) セツキシマブ (アービタックス) パニツムマブ (ベクティビックス) ペルツズマブ (パージェタ) ラムシルマブ (サイラムザ) ニボルマブ (オプジーボ) イピリムマブ (ヤーボイ) ペムブロリズマブ (キイトルーダ) アテゾリズマブ (テセントリク) デュルバルマブ (イミフィンジ) アベルマブ (バベンチオ) **微小管阻害薬** エリブリンメシル酸塩 (ハラヴェン)

分類不明抗がん剤

・テムシロリムス(トーリセル)

・エンホルツマブ　ベドチン（パドセブ）→適正使用ガイド参照

血管外漏出時の対応

血管外漏出

抗がん薬では，血管外に漏出した際に壊死を起こしやすい壊死起因性抗がん薬から壊死を起こす可能性が低い非壊死性抗がん薬まで，その危険度は表のようにさまざまである。

ただし，非壊死性抗がん薬でも大量に漏出すれば局所壊死を起こし得る。漏出の際には迅速かつ適切に対処するが，その前に，血管外漏出を起こさないように工夫し，注意喚起することがより重要である。

表　血管外漏出時の組織障害性に基づく抗がん薬の分類

壊死起因性抗がん薬	炎症性抗がん薬	非壊死性抗がん薬
ドキソルビシン	アクラルビシン	エノシタビン
ドキソルビシンリポソーム製剤	イリノテカン	シタラビン
イダルビシン	エトポシド	フルダラビン
エピルビシン	ノギテカン	ペメトレキセド
ダウノルビシン	オキサリプラチン	ブレオマイシン
ピラルビシン	カルボプラチン	ペプロマイシン
アムルビシン	シスプラチン	エリブリン
ミトキサントロン	ネダプラチン	ボルテゾミブ
カバジタキセル	イホスファミド	インターフェロン製剤
ドセタキセル	シクロホスファミド	インターロイキン製剤
パクリタキセル	テモゾロミド	モノクローナル抗体製剤
アルブミン懸濁型パクリタキセル	ダカルバジン	
ビノレルビン	ブスルファン	
ビンクリスチン	ベンダムスチン	
ビンデシン	メルファラン	
ビンブラスチン	ゲムシタビン	
ラニムスチン	フルオロウラシル	
ニムスチン	フルダラビン	
トラベクテジン	メトトレキサート	

予防法

①レジメンの変更が可能な場合，より短時間で投与する
②表在静脈が萎縮している場合は事前に腕を温め血管を拡張させる
③可能であれば，肘と手首の中間付近に点滴ルートを確保する
④留置針を使用し，漏れのないことを確認する

血管外漏出の危険性や初期症状について患者に説明し，点滴ルートを引っ張ったり体の下に敷かないよう注意を促し局所の違和感があればすぐにスタッフに伝えるように指導する。

血管外に漏出した際の対処

血管外に漏出した際には医師および看護師とのコミュニケーションを十分にとり，適切かつ迅速に対処することが必要である。まずは保存的治療を行うが，それができなければ外科的治療（手術）を行うことになる。

漏出した抗がん薬の種類や局所の症状に応じて，皮膚科への受診を早期に検討する。



ステロイド外用剤の塗布
strongestのステロイド外用剤（例えばデルモベート軟膏）を1日2回塗布する。擦り込まず，軽く塗布する。

図　ステロイド剤の局注範囲

*：アントラサイクリン系が漏出した場合，デクスラゾキサンの投与を検討する，［　］：必要に応じて検討

◇漏出患部の冷却および加温について：多くの抗がん薬では患部の冷却が推奨されているが，ビンカアルカロイド系などでは加温が推奨されている。

◇ステロイド局注について：デキサメタゾンおよびベクロメタゾン（4～8mg），プレドニゾロン（50～100mg），ヒドロコルチゾン（100～200mg）などのステロイドを，図のように漏出部位よりやや広範囲に局注する。疼痛緩和のために局所麻酔薬で総量約5～10mLに希釈することもある。

図5　血管外漏出の副作用対策シート

がん化学療法ワークシート　第5版　より抜粋

中止レジメン

＜呼吸器科＞

レジメン	CAV-Ⅱ			番号	RLC-09
適　応	SCLC				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	100mg	第 1 日	div	4 週 1 コース	
エトポシド	100mg	第 1-5 日	div		
アドリアシン	30mg	第 1 日	iv		
フィルデシン	3mg	第 1 日	iv		

レジメン	CBDCA+DOC 療法			番号	RLC-13
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC4～6 4～6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	CBDCA+GEM 療法			番号	RLC-14
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	GEM+S-1 療法			番号	RLC-17
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ジェムザール	1000mg/㎡	第 8,15 日	div	3 週 1 コース	
S-1	60mg/㎡	第 1～14 日	po		

レジメン	CBDCA+GEM+アバスチン療法			番号	RLC-19
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5～6 5～6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース 4～6 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div		
アバスチン	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	CBDCA+TXT+アバスチン			番号	RLC-20
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース 最大 6 コース	
タキソテール	60mg/㎡	第 1 日	div		
アバスチン	15mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	CDDP+TXT+アバスチン			番号	RLC-21
適　応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第１日	div	3 週 1 コース 3～6 コース	
タキソテール	60mg/㎡	第１日	div		
アバスチン	15mg/kg	第１日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	CDDP+NVB+アバスチン			番号	RLC-22
適　応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第１日	div	3 週 1 コース 3～6 コース	
ナベルビン	25mg/㎡	第 1,8 日	div		
アバスチン	15mg/kg	第１日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	TXT+アバスチン			番号	RLC-23
適　応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
タキソテール	60mg/㎡	第１日	div	3 週 1 コース	
アバスチン	15mg/kg	第１日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		

レジメン	PTX 単剤療法			番号	RLC-01
適　応	小細胞肺がん/非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
パクリタキセル	60～70mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	CPT-11 単剤療法			番号	RLC-02
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	GEM 単剤療法			番号	RLC-04
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	CBDCA+ PTX weekly 療法			番号	RLC-06
適　応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC4～6 4～6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	4 週 1 コース	
パクリタキセル	70mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	CDDP+DOC 療法			番号	RLC-12
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	CBDCA+CPT-11 療法			番号	RLC-16
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	4 週 1 コース	
トポテシン	60mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

レジメン	CDDP+S-1 と同時胸部放射線療法			番号	RLC-26
適　応	局所進行非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	60mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース 4～6 コース 放射線治療： 1 回 2 Gy　週 5 日　計 60 Gy	
S-1	80mg/㎡	第 1～14 日	p.o.		

レジメン	CDDP+GEM 療法			番号	RLC-32
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	CDDP+CPT-11 療法			番号	RLC-38
適　応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	80mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
トポテシン	60mg/㎡	第 1,8,15 日	div		

＜泌尿器科＞

レジメン	DEC 療法			番号	UPC-01
適　応	進行性前立腺がん(ホルモン抵抗性)				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	4 週 1 コース 効果ある時継続投与	
タキソテール	40mg	第 1,8,15,22 日	div		
エストラサイト	3～4cap	連日	p.o.		

レジメン	GCD 療法			番号	UBC-03
適　応	尿路上皮がん				［保険適応なし］
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	300mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 効果ある時継続投与	
ジェムザール	1000mg/㎡	第 1,8 日	div		
タキソテール	30mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	GD 療法			番号	UBC-04
適　応	浸潤性膀胱がん(尿路上皮がん)				［保険適応なし］
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ジェムザール	800mg/㎡	第 1,8,15 日	div	4 週 1 コース 2～4 コース	
タキソテール	60mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	DP 療法（weekly）			番号	UPC-03
適　応	ホルモン抵抗性前立腺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソテール	30ｍｇ/㎡	第 1,8, 15,22,29 日	div	6 週 1 コース	
プレドニン	10ｍｇ/日（分 2）	第 1～42 日	po		

レジメン	イムネース投与療法（IL-2）			番号	UKC-01
適　応	腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
イムネース	70 万単位/body	第 1,3,5 日	div	週 3 回連続投与 最低 6 ヶ月	

レジメン	トーリセル単剤療法			番号	UKC-02
適　応	進行・転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トーリセル	25 mg/body	第 1 日	div	1 週毎繰り返し	

レジメン	MPB 療法			番号	UPE-01
適　応	陰茎がん			［保険適応なし］	
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	20mg/㎡	第 2-6 日	div	28 日 1 コース	
メソトレキセート	200mg/㎡	第 1,15,22 日	div		
ブレオ	10mg/㎡	第 2-6 日	div		

レジメン	低用量 DP 療法			番号	UPC-04
適　応	ホルモン抵抗性前立腺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
タキソテール	30mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
プレドニン	10mg/日（分 2）	第 1～21 日	po		

＜消化器内科＞

レジメン	l-LV+5FU(RPMI)療法			番号	◎DCO-01
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アイソボリン	250mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div(2 時間)	8 週 1 コース	
5-FU	600mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div(全開)		

レジメン	GEM 腹腔内投与			番号	DPA-03
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ジェムザール	500mg/㎡	第 1,8,15 日	腹腔内投与	4 週 1 コース	

レジメン	GEM 腹腔内投与			番号	DBI-02
適 応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ジェムザール	500mg/㎡	第 1,8,15 日	腹腔内投与	4 週 1 コース	

レジメン	mFOLFOX6＋bevacizumab 療法 二次治療			番号	DCO-07
適 応	切除不能・転移性進行大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アバスチン	10mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	FOLFIRI＋bevacizumab 療法　二次治療			番号	DCO-09
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アバスチン	10mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/㎡	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	MMC＋5-FU＋RT 療法			番号	DAN-01
適 応	肛門がん（扁平上皮がん）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
マイトマイシン	10mg/㎡	第 1,29 日	iv	RT は 5 日/週を 6 週間 1 コースで終了	
5-FU	800mg/㎡	第 1～4 日 第 29～32 日	div(24 時間)		

＜外科＞

レジメン	乳がん AC 療法			番号	SBR-02
適 応	術後補助化学療法　転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アドリアシン	40～60mg/㎡	第 1 日	div	3～4 週 1 コース 術後補助の場合 4 コース	
エンドキサン	500～600mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	乳がん PAC 療法			番号	SBR-05
適 応	転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
タキソール	175～210mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	乳がん VNB+HER 療法			番号	SBR-08
適 応	進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2 回目以降）	第 1,8,15 日	div	3 週 1 コース	
ナベルビン	25mg/㎡	第 1,8 日	div （側管から全開）		

レジメン	乳がん HER 療法			番号	SBR-09
適 応	進行・転移・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div	毎週繰り返し 1 週 1 コース	

レジメン	乳がん weekly PAC+HER 療法			番号	SBR-10
適 応	進行・転移・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
タキソール	80mg/㎡	第 1 日	div	毎週繰り返し 1 週 1 コース	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2 回目以降）	第 1 日	div		

レジメン	乳がん DOC+HER 療法			番号	SBR-11
適 応	進行・転移・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ドセタキセル	75mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2 回目以降）	第 1,8,15 日	div		

レジメン	乳がん CAF 療法			番号	SBR-13
適 応	術後補助化学療法、転移・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アドリアシン	50mg/㎡	第 1 日	div	3 週 1 コース 6 コース繰り返す	
エンドキサン	500mg/㎡	第 1 日	div		
5FU	500mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	乳がん HER+S-1 療法			番号	SBR-14
適 応	進行・再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2 回目以降）	第 1,8,15,22 日	div	HER：4 週投与 1 週休薬 *S-1：①4 週投与 2 週休薬 ②2 週投与 1 週休薬 （③隔日投与も可） 体表面積 1.25 ㎡未満　40mｇ/回 1.25 ㎡以上～1.5 ㎡未満　50mｇ/回 1.5 ㎡以上　60mｇ/回	
S-1	*右記		po（1 日 2 回）		

レジメン	乳がん HER+カペシタビン療法			番号	SBR-15
適 応	進行・再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2回目以降）	第1,8,15,22日	div(2時間)	HER：毎週 ゼローダ： 3週投与 1週休薬 *体表面積 1.31㎡未満　900mｇ/回 1.31㎡以上～1.64㎡未満 1200mｇ/回 1.64㎡以上　1500mｇ/回	
ゼローダ	*右記	第1～21日	po(1日2回)		

レジメン	乳がん GEM＋HER 療法			番号	SBR-18
適 応	切除不能・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1250mg/㎡	第1,8日	div	3週1コース 繰り返し	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2回目以降）	第1,8,15日	div		

レジメン	乳がん アブラキサン+HER 療法			番号	SBR-20
適 応	手術不能・進行・再発乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2回目以降）	第1,8,15日	div	3週1コース	
アブラキサン	260mg/㎡	第1日	div		

レジメン	乳がん HER+ハラヴェン bi-weekly 療法			番号	SBR-34
適 応	切除不能・進行再発・転移性乳がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ハラヴェン	1.4mg/㎡	第1日	div	2週1コース ハラヴェン 減量時の投与量 1.4mg/㎡ → 1.1mg/㎡ → 0.7mg/㎡→中止	
ハーセプチン	4mg/kg（初回のみ） 2mg/kg（2回目以降）	第1,8日	div		

レジメン	食道がん nedaplatin 療法			番号	SES-04
適　応	転移・進行・再発食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	80～100mg/㎡	第 1 日	div	5 週 1 コース	

レジメン	食道がん nedaplatin+5FU 療法			番号	SES-05
適　応	食道がん術後、肝転移				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	5mg	第 1～5 日	div	1 週 1 コース 2 コース	
5-FU	250mg	第 1～7 日	iv		

レジメン	食道がん nedaplatin+5FU 低用量療法			番号	SES-06
適　応	食道がん術後、肝転移				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	5mg/㎡	第 1～5 日	div	1 週 1 コース	
5-FU	250mg/㎡	第 1～5 日	div		

レジメン	食道がん nedaplatin+5FU 低用量療法Ⅱ			番号	SES-07
適　応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アクプラ	10mg	第 1～5 日	div	1 週 1 コース	
5-FU	250mg	第 1～5 日	div		

レジメン	胃がん CDDP+5FU 低用量療法			番号	SST-02
適　応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	10mg/㎡	第 1 日	div	4 週 1 コース	
5-FU	500mg/㎡	第 1～5 日	div		

レジメン	胃がん CDDP+5FU 継続低用量療法			番号	SST-11
適　応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	10mg/Body	第 1～5, 8～12 日	div	2 週 1 コース	
5-FU	500mg/Body	第 1～5, 8～12 日	div		
アイソボリン	250mg/㎡	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div	8 週 1 コース	
5FU	600mg/㎡	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div（全開）		

レジメン	胃がん 5FU+l-LV 療法			番号	SST-06
適 応	切除不能 転移・再発胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アイソボリン	250mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div	8 週 1 コース	
5FU	600mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div（全開）		

レジメン	大腸がん CPT-11+5FU+l-LV(IFL)療法			番号	◎SCO-01
適 応	切除不能 進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	
5-FU	500mg/㎡	第 1,8 日	iv		
アイソボリン	10mg/㎡	第 1,8 日	div		

レジメン	大腸がん l-LV+5FU(RPMI)療法			番号	◎SCO-02
適 応	切除不能 進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アイソボリン	250mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	div	8 週 1 コース	
5-FU	600mg/㎡	第 1,8,15,22,29,36 日	iv		

レジメン	大腸がん CPT-11 変法療法			番号	SCO-04
適 応	切除不能 進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	大腸がん FOLFOX4 療法			番号	SCO-05
適　応	進行・再発大腸がん　　直腸がんにおける術後補助化学療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間	2 週 1 コース	
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	600mg/㎡	第 1,2 日	div 22 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん FOLFOX4 変法療法			番号	SCO-06
適　応	進行・再発大腸がん　　直腸がんにおける術後補助化学療法				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間	2 週 1 コース	
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	300mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん FOLFIRI 療法			番号	SCO-07
適 応	切除不能　進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん FOLFIRI 変法療法			番号	SCO-08
適 応	切除不能　進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	500mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		
5-FU	1000mg/㎡	第 2 日	div 4 時間		

レジメン	大腸がん bevacizumab+IFL 療法			番号	SCO-09
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	
5-FU	500mg/㎡	第 1,8 日	div(iv)		
アイソボリン	10mg/㎡	第 1,8 日	div(iv)		
アバスチン	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		

レジメン	大腸がん bevacizumab+IFL 療法　二次治療			番号	SCO-10
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8 日	div	3 週 1 コース	
5-FU	500mg/㎡	第 1,8 日	div(iv)		
アイソボリン	10mg/㎡	第 1,8 日	div(iv)		
アバスチン	10ｍｇ/ｋｇ	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 療法			番号	SCO-11
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	600mg/㎡	第 1,2 日	div 22 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 療法　二次治療			番号	SCO-12
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	10mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	600mg/㎡	第 1,2 日	div 22 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 変法療法			番号	SCO-13
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
アバスチン	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第1日はオキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	300mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 変法療法　二次治療			番号	SCO-14
適 応	進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
アバスチン	10ｍｇ/ｋｇ	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第1日はオキサリプラチンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	300mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 療法			番号	SCO-15
適 応	切除不能　進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アバスチン	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン 投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 療法　二次治療			番号	SCO-16
適 応	切除不能　進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アバスチン	10ｍｇ/ｋｇ	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 変法療法			番号	SCO-19
適 応	切除不能　進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アバスチン	5mg/kg	第 1 日	div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと 同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div（全開） アイソボリン 投与後		
5-FU	500mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		
5-FU	1000mg/㎡	第 2 日	div 4 時間		

レジメン	大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 変法療法			番号	SCO-20
適 応	切除不能　進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アバスチン	10ｍｇ/Ｋｇ	第 1 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	500mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		
5-FU	1000mg/㎡	第 2 日	div 4 時間		

レジメン	大腸がんアービタックス＋FOLFOX4 療法			番号	SCO-24
適 応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （２回目以降）	第 1，8 日	div 初回 120 分 ２回目以降 60 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	600mg/㎡	第 1,2 日	div 22 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がんアービタックス＋FOLFOX4 変法療法			番号	SCO-25
適 応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （２回目以降）	第 1，8 日	div 初回 120 分 ２回目以降 60 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	300mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がんアービタックス＋FOLFIRI 療法			番号	SCO-26
適　応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （２回目以降）	第 1，8 日	div （初回 120 分、2 回目以降 60 分）	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がんアービタックス＋FOLFIRI 変法療法			番号	SCO-27
適　応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アービタックス	400mg/㎡（初回のみ） 250mg/㎡ （２回目以降）	第 1，8 日	div （初回 120 分、 2 回目以降 60 分）	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	500mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		
5-FU	1000mg/㎡	第 2 日	div 4 時間		

レジメン	大腸がんベクティビックス＋FOLFOX4 療法			番号	SCO-29
適 応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	d iv 60 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	600mg/㎡	第 1,2 日	div 22 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がんベクティビックス＋FOLFOX4 変法療法			番号	SCO-30
適 応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	d iv 60 分	2 週 1 コース	
オキサリプラチン	85mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	100mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1,2 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	300mg/㎡	第 1,2 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がんベクティビックス＋FOLFIRI 療法			番号	SCO-31
適 応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	div 60 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div(全開) アイソボリン投与後		
5-FU	2400mg/㎡	第 1～3 日	div 46 時間 前記 5-FU 投与後		

レジメン	大腸がんベクティビックス＋FOLFIRI 変法療法			番号	SCO-32
適 応	進行・転移・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
ベクティビックス	6mg/kg	第 1 日	div 60 分	2 週 1 コース	
トポテシン	150mg/㎡	第 1 日	div 2 時間		
アイソボリン	200mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 トポテシンと同時投与		
5-FU	400mg/㎡	第 1 日	div（全開） アイソボリン投与後		
5-FU	500mg/㎡	第 1 日	div 2 時間 前記 5-FU 投与後		
5-FU	1000mg/㎡	第 2 日	div 4 時間		

レジメン	大腸がん IRIS+アバスチン療法			番号	SCO-35
適　応	治癒切除不能な進行・再発大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
S-1	80～120mg/日	第 1～14 日	p.o.	4 週 1 コース *	
アバスチン	5mg/kg	第 1,15 日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分		
トポテシン	125mg/㎡	第 1,15 日	div 2 時間		

＜耳鼻科＞

レジメン	照射併用化学療法その 1			
適　応	頭頸部がん			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）
タキソテール	10mg/50kg	第 1 日	div	○照射中に週 1 回点滴静注 （原則として照射中は続行） ○「その 2」以降もありえる

レジメン	CDDP+5FU			
適　応	頭頸部がん			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）
シスプラチン	100mg/50kg	第 1 日	div	○4 週 1 コース ○コース数は症例により異なる
5FU	1000mg/50kg	第 1-5 日	div	

レジメン	放射線併用 NDP+5FU 療法			番号	OHN-01
適　応	頭頸部がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール （投与間隔、コース数等）	
アクプラ	100mg/㎡	第 1 日	div	○4 週 1 コース ○放射線照射中に 2 コース行う	
5FU	1000mg/ body	第 1-5 日	div		

＜産婦人科＞

レジメン	CPT11+MMC 療法			番号	GUT-05
適 応	進行・再発子宮頚がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
トポテシン	100mg/㎡	第 1,8,15 日	div(120 分)	4 週 1 コース	
マイトマイシン	10mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	CAP 療法			番号	GOV-07
適 応	卵巣がん、子宮内膜がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
カルボプラチン	AUC5 5×(GFR+25)mg	第 1 日	div	3-4 週休薬	
ファルモルビシン	50mg/㎡	第 1 日	div		
エンドキサン	500mg/㎡	第 1 日	div		

レジメン	PVP 療法			番号	GUT-01
適 応	子宮頚部扁平上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
シスプラチン	60mg/㎡	第 1 日	div	1-2 週休薬	
エクザール	4mg/㎡	第 1,2 日	div		
ペプレオ	10mg/body	第 1,8,15 日	24 時間持続皮下注		

＜脳神経外科＞

レジメン	IAR 療法(初期療法)			
適 応	膠芽腫、悪性星細胞腫			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)
放射線	50～60Gy	第 1 日より照射		
ニドラン	80mg/㎡	第 1,36 日	iv	
フェロン	200 万 IU/㎡	第 3 日より 週 3 回、8 週間	div	

レジメン	IAR 療法(維持療法)			
適 応	膠芽腫、悪性星細胞腫			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)
A 群 ： ニドラン	80mg/㎡	6～8 週おき	iv	初期療法終了後、実施
B 群 ： ニドラン	80mg/㎡	6～8 週おき	iv	
フェロン	200 万 IU/㎡	1～2 週に 1 回	div	

レジメン	フェロン＋テモダール療法　　［患者限定レジメン］			
適 応	悪性神経膠腫再発			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)
フェロン	300 万単位	第 1 日	Div	28 日 1 コース 内服不可の場合はテモダール div 使用
テモダール	260mg/日	第 1～5 日	p.o.	

＜血液内科＞

レジメン	ABVd 療法			番号	HHL
適　応	ホジキンリンパ腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）	
アドリアシン	25mg/㎡	第 1,15 日	div	4 週 1 コース	
ブレオ	10mg/㎡	第 1,15 日	div		
エクザール	6mg/㎡	第 1,15 日	div		
ダカルバジン	250mg/㎡	第 1,15 日	div		

レジメン	VAD 療法			
適　応	骨髄腫			
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール（投与間隔、コース数等）
オンコビン	0.4mg	第 1～4 日	24h 持続静注	4 週 1 コース
アドリアシン	9mg/㎡	第 1～4 日	24h 持続静注	
デカドロン	40mg	第 1～4 9～12 17～20 日	div	